Fonti non glucidiche

*Polisaccaridi
e disaccaridi*

GLUCOSIO

*glicolisi
(energia)*

*via dei pentosi
(potere riducente)*

GLUCONEOGENESI

Caratteristiche della gluconeogenesi da piruvato

*avviene in parte nei mitocondri e citosol
(principalmente nel fegato)*

consta di 11 reazioni

*ripercorre i metaboliti della glicolisi ma
il percorso è diverso*

La gluconeogenesi negli animali

$$\Delta G^{\circ} = - 57 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta G = - 16 \text{ KJ/mol}$$

Negli animali la gluconeogenesi può essere accoppiata alla glicolisi: ciclo di Cori

Trasformazione del piruvato in *fosfoenolpiruvato*

*Non si può seguire la strada glicolitica a ritroso
poiché la reazione della piruvato chinasi è
irreversibile*

by-pass gluconeogenetico

2 (4) reazioni

Piruvato carbossilasi

Malato deidrogenasi mitocondriale

Reazioni nel citosol

Riossidazione del malato a ossalacetato

Sintesi del fosfoenolpiruvato

Fosfoenolpiruvato carbossichinasi

Guanosina trifosfato (GTP)
o ATP (a seconda se avviene
dentro o fuori i mitocondri)

occorre una
reazione che
generi NADH

glicolisi

gluconeogenesi

2° bypass

$$\Delta G = -14 \text{ KJ/mol}$$

3° bypass

$$\Delta G = -16 \text{ KJ/mol}$$

glucosio-6-fosfato

glucosio

Riserva:

- Glicogeno
- Trealosio (insetti)
- Saccarosio (piante)
- Amido (piante)

nel sangue
concentrazione costante
(circa 5.2 mM)

Potere riducente (NADPH)
(via dei pentosi-fosfato)

Tossicità metabolica dell' etanolo

Glicogenosintesi

La biosintesi di glicogeno ha come intermedio:

UDP-glucosio

Sintesi del glicogeno

La glicogeno sintasi è sottoposta a regolazione, **ma quando è fosforilata è inattiva**

Via dei pentoso-fosfati

Via dei pentosi: percorso ossidativo

Via dei pentosi: percorso ossidativo

6-fosfogluconato
deidrogenasi

Ribosio-5-fosfato
isomerasi

Via dei pentosi: percorso non ossidativo

Reazione della transchetolasi

Transchetolasi

Reazione della transaldolasi (trasferimento di un frammento a 3C)

Transaldolasi

2 Glucosio-6-fosfato

2 Fruttosio-6-fosfato

Fruttosio-6-fosfato
+
Gliceraldeide-3-fosfato

Eritrosio-4-fosfato
+
Xilulosio-5-fosfato

Transchetolasi

Fruttosio-6-fosfato
+
Eritrosio-4-fosfato

Gliceraldeide-3-fosfato
+
Sedoeptulosio-7-fosfato

Gliceraldeide-3-fosfato
+
Sedoeptulosio-7-fosfato

Xilulosio-5-fosfato
+
Ribosio-5-fosfato

2 Xilulosio-5-fosfato

2 Ribulosio-5-fosfato

2 Ribulosio-5-fosfato

2 Ribosio-5-fosfato

2 Glucosio-6-fosfato
+
Gliceraldeide-3-fosfato

3 Ribosio-5-fosfato

Via dei pentosi: regolazione da NADPH

Funzioni biologiche del NADPH

- Principale donatore di elettroni in ambiente citosolico per
 - biosintesi (acidi grassi, colesterolo, aminoacidi)
 - mantenimento di elevati livelli di glutathione ridotto, tripeptide fondamentale nel tenere sotto controllo la concentrazione delle specie reattive dell'ossigeno

Glutatione ridotto
(GSH)

Glutatione ossidato
(GSSG)

Tossicità della tachipirina

95%

glucuronidazione
solfatazione

l'eccesso di
paracetamolo
impoverisce la
cellula di GSH

Cenni di regolazione metabolica

Nell'uomo 4000 geni (12%) codificano per proteine di regolazione

E' fondamentale mantenere un costante rifornimento di ATP per i processi cellulari che richiedono energia

Alterazioni del rapporto ATP/ADP influenzano profondamente le reazioni che richiedono o producono ATP

Si sono evoluti meccanismi in grado di rispondere a variazioni del rapporto ATP/ADP basati sul controllo dell'attività di particolari enzimi

La concentrazione di ATP è regolata dalla biodisponibilità di ossigeno

La respirazione mitocondriale (vedi oltre) fornisce grandi quantità di ATP

Condizioni di ipossia innescano la glicolisi (attraverso il fattore HIFalfa , hypoxia-inducible factor)

Nelle cellule cancerose la respirazione mitocondriale è inibita e la glicolisi procede più velocemente

Nelle cellule cancerose alcuni enzimi glicolitici sono espressi a concentrazione più elevata

Glucosio-6fosfato: crocevia metabolico

Controllo del flusso glicolitico

Fosfofruttochinasi

Piruvato chinasi

La glicolisi è regolata a livello della fosfofruttochinasi 1

● *PFK attiva* ● *PFK non attiva*

● *F6P*

● *ATP*

ATP bassa

ATP elevata

Il modulatore si lega in un sito allosterico

Controllo della fosfofruttochinasi 1

Ciclo futile

somma:

Controllo di glicolisi e gluconeogenesi: ruolo del fruttosio-2,6-bisfosfato

fruttosio 2,6-bisfosfato

Sintesi del F-2,6BP

Degradazione del F-2,6BP

L'effetto del F2,6BP si esplica nel fegato:

*la sua biosintesi è promossa dall'insulina,
l'ormone ipoglicemizzante*

*la sua degradazione è innescata dal
glucagone, l'ormone iperglicemizzante*

Insulina e glucagone sono ormoni peptidici
Ormone: sostanza il cui effetto biologico si
esercita lontano dal luogo in cui viene
sintetizzata

Effetti del fruttosio-2,6-bisfosfato

Stimola la glicolisi

Inibisce la gluconeogenesi

Effetti molecolari del fruttosio-2,6-bisfosfato (F2,6BP): attivazione enzimatica

Attività catalitica della fosfofrutto chinasi 1

Altri effetti dell'insulina

- incremento di sintesi:
 - esochinasi,
 - fosfofruttochinasi-1,
 - piruvato chinasi
 - enzimi della biosintesi degli acidi grassi
- attiva il trasportatore del glucosio nel muscolo, cuore e tessuto adiposo
- diminuisce la sintesi di
 - PEPCK
 - glucosio-6fosfatasi

Piruvato chinasi: un altro enzima regolato da metaboliti