Elementi di biochimica

Prof. Paolo Parenti

Edificio U1, 2° piano, stanza 2032
piazza della Scienza 1

e-mail: paolo.parenti@unimib.it

Quinta edizione, 2010
1312 pp.

versione
sintetica

2010, 496 pp.

VOET Donald , VOET Judith G , PRATT
Charlotte W
Fondamenti di Biochimica

TYMOCZKO John_L BERG Jeremy M , , STRYER Lubert
Principi di BIOCHIMICA.

H. Robert Horton
Laurence A. Moran
K. Gray Scrimgeour
Marc D. Perry
J. David Rawn

Prentice Hall, 2008

800 pp.
€ 76,00

800 pp.
€ 32,00

Materiale didattico

SITO DOCENTE

Biochimica

disciplina che descrive in termini molecolari le strutture, i meccanismi e i processi chimici condivisi dagli organismi viventi e fornisce i principi che sottostanno alla complessità della vita in tutte le sue forme.

Livello di studio della biochimica

Quando nasce la biochimica?

Quando si dimostra che la fermentazione alcolica è possibile in estratti di cellule di lievito

(Buchner, 1897)

Eduard Buchner (1860-1917),
Nobel per la Chimica nel 1907

The Journal of Biological Chemistry – ottobre 1905

Alcune ricadute applicative della biochimica:

medicina (farmaci, test diagnostici)

agricoltura (insetticidi, erbicidi)

industria (analisi di qualità, biosensori,
industria alimentare, cosmetica, prodotti per
la casa)

32 premi Nobel per la Chimica
su argomenti biochimici

parole chiave di questa lezione ...

- Biomolecola
- Cellula
- Enzima
- substrato
- ATP (adenosintrifosfato)

*La logica molecolare della vita.
Oltre 2 milioni di specie descritte*

Ciò che è vero per il batterio (*E. coli*) vale anche per l'elefante

Jacques Monod

Gli elementi unificanti

- la composizione chimica (elementare e molecolare)
- la struttura cellulare
- l'ATP (energia cellulare)
- la catalisi enzimatica
- la replicazione

I bioelementi

- Elementi molto rappresentati
- Elementi in tracce essenziali per tutti gli organismi
- Elementi in tracce essenziali per alcuni organismi

¹ H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ar	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	¹¹¹ Rg							

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

“La chimica basata sul carbonio è alla base della vita ed è responsabile per numerosi fenomeni affascinanti, come il colore dei fiori, il veleno dei serpenti e la produzione di sostanze che uccidono i batteri come la penicillina.”

(Stoccolma, discorso in occasione del conferimento del Premio Nobel per la Chimica 2010)

Le **biomolecole** hanno molti gruppi funzionali, importanti nell'interazione con altre biomolecole

Coenzima A

Principali
gruppi
funzionali
in biochimica

metilico

etilico

fenilico

alcolico

chetonico

aldeidico

carbossilico

estere

anidridico

aminico

amidico

guanidinico

imidazolico

Principali gruppi funzionali in biochimica

tiolico o sulfidrilico

disulfurico

tioestere

fosforico

fosfoanidridico

anidridico misto

Stessa composizione ma diversa struttura

In biochimica si utilizza il sistema di nomenclatura degli stereoisomeri detto della *configurazione assoluta* D e L, basato sulla gliceraldeide come proposto da Fischer nel 1891

Non descrive più di un centro chirale (vedi sistema R, S)

D-gliceraldeide

L-gliceraldeide

(*R*)-gliceraldeide

(*S*)-gliceraldeide

Le interazioni tra biomolecole sono stereospecifiche

- Gli zuccheri utilizzati dal metabolismo sono in forma D
- Le proteine contengono solo L-aminoacidi

L-Aspartil-L-fenilalanina metil estere
o aspartame (gusto dolce)

L-Aspartil-D-fenilalanina metil estere
(gusto amaro)

La **cellula** è l'unità fondamentale
dei viventi

Robert Hooke (1635-1703)
conia il termine cellula (1665)

sughero

1. Esistono organismi composti da una sola cellula (unicellulari) o da più cellule (pluricellulari) (nell'uomo 100 miliardi di 200 tipi diversi)
2. Le cellule sono sistemi aperti, scambiano energia e materia con l'ambiente e si possono replicare.
3. All'interno delle cellule avvengono reazioni chimiche catalizzate dagli enzimi

Le cellule hanno caratteristiche strutturali comuni:

1. sono circondate da una membrana semipermeabile proteolipidica che racchiude un liquido denso, il citoplasma

2. Il citoplasma è costituito da:

- il *citosol*, soluzione acquosa contenente ioni inorganici, 2000-3000 enzimi e circa 1500 diverse biomolecole a varie concentrazioni;
- *organuli cellulari*, dispersi nel citosol
- un *nucleo*, racchiuso (cellule eucariote) o meno (cellule procariote) da membrana

(A)

2 μm

Cellula procariota

I virus sono cellule?

Struttura del virus HIV

Rapporti dimensionali

90 nm virus HIV

2 μm *E. coli* (batterio) (vol.: 2 fL)

7 μm globulo rosso (vol.: 90 fL)

15-20 μm cellula del fegato

200 μm acaro della polvere (multicellulare)

15 cm cellula uovo di struzzo

Gli organismi viventi sono **sistemi aperti**
(scambiano materia ed energia con l'ambiente per
mantenere uno stato di equilibrio dinamico).
Sono sistemi aperti in stato stazionario.

L'energia è ottenuta dal sole
o da molecole complesse
mediante reazioni catalizzate da
enzimi

e conservata in legami chimici ad
"alta energia" dell'**ATP**

Gli organismi viventi sono
entità altamente ordinate
con strutture non casuali,
ricche di informazione,
e povere di entropia

**Vi è un momento simile ad una marea
nel destino degli uomini
che, se si segue, porta alla fortuna,
se si manca, tutto il viaggio della loro vita
è destinato a superficialità e miseria.**

Giulio Cesare, Shakespeare

Elevata entropia, poca informazione

Per mantenere uno stato povero di entropia...

gli organismi hanno
bisogno di energia e
materia dall'ambiente

Si può dire che sono in un
equilibrio dinamico (stato
stazionario)

Gli organismi viventi immagazzinano energia sotto forma di molecole di ATP

$\text{P}-\text{P}-\text{P}$ —Adenosina (Adenosina *trifosfato*, ATP)

(Adenosina *difosfato*, ADP)

Fosfato inorganico (P_i)

(Adenosina *monofosfato*, AMP)

Pirofosfato inorganico (PP_i)

**Per poter svolgere
tutte le attività
cellulari
prioritario per la
cellula è
mantenere un
elevato rapporto
ATP/ADP**

Enzima

Substrato

Sito attivo o catalitico

1. Gli enzimi consentono alle reazioni cellulari di avvenire ad una velocità “utile”
2. Le reazioni enzimatiche sono concatenate in *vie metaboliche*
3. Le vie metaboliche funzionano in modo coordinato grazie a meccanismi di controllo dell'attività enzimatica

La continuità genetica: il DNA

- L'informazione genetica, richiesta per svolgere le funzioni vitali, è codificata nella sequenza lineare di quattro tipi di nucleotidi

citosina

timina (metil-uracile)

guanina

adenina

Le informazioni sono contenute in molecole di DNA a doppio filamento

Le cellule (e gli organismi viventi) si **riproducono** con elevata fedeltà per trasferire le informazioni biologiche alle cellule figlie (le lettere corrispondono alle basi azotate che compongono la molecola).

Le informazioni sono codificate
(codice genetico)

THE FAT BAT AND THE BIG RAT SAT

L'informazione è prima trascritta e poi tradotta (ad es. una proteina)

RNA, contiene uracile anziché timina

Occasionali **mutazioni** permettono di adattarsi all'ambiente e di evolversi in nuove forme.

THE FAT BAT AND THE BIG RAT EAT
sostituzione

L'evoluzione spiega la sostanziale
somiglianza di tutti gli organismi
viventi